

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN UNA POBLACIÓN SEMIURBANA

M.Herranz;J.M.Carmona;E.Quintero;A.Fabra;E.Pablos;J.Jimenez

Objetivos: conocer las características epidemiológicas y clínicas de los cirróticos atendidos en una población semiurbana para poder contar con acciones claras para prevenir dicha enfermedad.




Metodología: estudio observacional transversal poblacional de 22500 habitantes. Muestra de 204 pacientes cirróticos controlados en nuestro centro (población semiurbana) en el periodo comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2015.

Análisis de variables como edad, sexo, etiología y estadiaje (según clasificación de Child-Pugh) de la cirrosis y motivos de hospitalización si se produjeron en este periodo. Para el análisis estadístico hemos utilizado el programa EPI INFO versión 7.



n 204
Edad media 63,4 a.
Mujeres 45,1%

hepatocarcinoma
7,9%

Etiología cirrosis



Motivos hospitalización



CLASIFICACIÓN DE CHILD PUGH			
	1	2	3
Ascitis	NO	LEVE	SEVERA
Encefalopatía	0	I-II	III-IV
TP	< 4	4-9	10 y mas
Albumina Serica (g%)	> 3.5	2.8-3.5	< 2.8
Bilirubina Total (mg%)	1-2	2-3	> 3

5-6 puntos Child-Pugh A
7-9 puntos Child-Pugh B
10 o más puntos Child-Pugh C⁽¹⁶⁾

Comentario y conclusiones:

En nuestra población la cirrosis afecta a varones en mayor proporción y son el consumo crónico de alcohol y la enfermedad viral crónica sus principales causas. El sangrado digestivo es el principal motivo de hospitalización no infecciosa y la patología urinaria destaca como causa infecciosa. La mayoría de nuestros cirróticos se encuentran en estadios avanzados de la enfermedad.