

## CARCINOMATOSIS PERITONEAL ASOCIADA A NEOPLASIA DE OVARIO: UNA COMBINACIÓN FRECUENTE

Ref 089

### DESCRIPCIÓN DEL CASO:

Mujer de 52 años sin antecedentes de interés. Presenta desde hace un mes dolor abdominal cólico, que en principio es diagnosticado por su médico como infección urinaria y tratada con antibióticos, fosfomicina en dos ocasiones y azitromicina. Acude a urgencias del centro de salud por persistir el dolor hipogástrico. En su exploración se comprueba buen estado general así como Combur con hematíes, sin leucos ni nitritos, objetivándose a nivel hipogástrico una zona endurecida con morfología ovoidea y adelgazada en su zona media, por lo que se la envía a hospital.

Ecografía y TAC abdominales muestran conglomerados adenopáticos que se continúan con un omental cake y líquido ascítico. Con estos datos se indica ecografía ginecológica que objetiva dos grandes masas heterogéneas poliquísticas y vascularizadas. La RM confirma el diagnóstico de CP secundaria a neo de ovario.

### ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN:

La CP es una forma de diseminación a través del peritoneo de tumores malignos gastrointestinales y ginecológicos que en la clínica evidenciaremos de forma variable, desde pequeños nódulos hasta grandes depósitos tumorales en forma de masa intraabdominal. La actuación del médico de familia es clave, pues ante una palpación abdominal que revele nodulación/es o masa abdominal debe sugerir CP e iniciar rápidamente su valoración a nivel hospitalario sabiendo que el cáncer de ovario es el tumor que más frecuentemente la produce, obteniéndose buenos resultados terapéuticos al combinar una estrategia de cirugía radical especializada con quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria hipertérmica.

### INTRODUCCIÓN:

El cáncer de ovario constituye la causa más frecuente de carcinomatosis peritoneal (CP). El 60% de ellos tiene extensión a serosa peritoneal en el momento de su diagnóstico. Considerada como signo de enfermedad generalizada y desenlace fatal, hoy se afronta con aceptables resultados terapéuticos.

### PALABRAS CLAVE

Carcinomatosis, peritoneo, cirugía, quimioterapia.

### BIBLIOGRAFÍA Y MÉTODO DE BÚSQUEDA:

Ceelen WP, Hesse U, de Hemptinne B, Pattyn P. Hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion in the treatment of locally advanced intra-abdominal cancer. Br J Surg 2000;87:1006–15.

Witkamp AJ, de Bree E, Kaag MM, Boot H, Beijnen JH, van Slooten GW, et al. Extensive cytoreductive surgery followed by intra-operative hyperthermic intraperitoneal chemotherapy with mitomycin-C in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal origin. Eur J Cancer 2001;37:979–84.

Método de búsqueda: PubMed y MeSH.

