

DESPISTAJE DE TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN EMBARAZADAS

Autores: Alejandro Carmona, Lourdes Rodríguez, Bernardo Rodríguez
UGC de Iznalloz, UGC de Armilla, Distrito Metropolitano de Granada

El objetivo del estudio es determinar la consistencia interna, la reproductibilidad y la validez de criterio del cuestionario SCOFF (acrónimo : sick, control, one, fat, food) en mujeres embarazadas para el despistaje de los trastornos de la conducta alimentaria.

Se llevó a cabo un estudio de validación con muestreo transversal al azar de 385 mujeres embarazadas de dos poblaciones. Se aplicó de manera independiente el cuestionario SCOFF y la entrevista diagnóstica internacional compuesta.

149 (38,7%) mujeres embarazadas positivas en la puntuación del cuestionario SCOFF. La sensibilidad fue 78,4% (IC95%, 64,3%- 88,2%), especificidad de 75,8% (IC95%, 68,9%-81,6%), el valor predictivo positivo de 46,5% (IC95%, 35,8%-57,5%) y el valor predictivo negativo de 92,9% (IC95%, 87,3%-96,2%). El área bajo la curva ROC fue de 0,823 (IC95%, 0,760-0,887), el alfa de Cronbach de 0,480 y la kappa media de Cohen de 0,433 (IC95%, 0,315-0,552). La concordancia prueba-reprueba fue de 91,6% (IC95%, 85,5%-95,7%).

El cuestionario SCOFF parece ser una buena alternativa como instrumento de despistaje para detectar los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres embarazadas, por su sencillez y rapidez de administración.

GRAND

NADA 20

DATA 16
26-28
MAYO

