

Titulo:

DISTENSIÓN ABDOMINAL EN UNA ADOLESCENTE

Autores:

Pardo Del Olmo Saiz, S.(1); Piris Santamaria,M.S(2); Ruiz Guerra,M.A.(3);Grande Grande,R.(4); Santos Urrutia,A.(5); Pellejero Pacheco,S.(6).

Centro de trabajo:

(1) C.S Camargo interior, Cantabria; (2) C.S Cotolino I, Cantabria; (3) C.S Campoo, Cantabria ; (4) C.S Rubayo, Cantabria;(5) C.S Campoo , Cantabria;(6) C.S Nueva Montaña, Cantabria.

Introducción

Las masas tumorales en hemiabdomen inferior son causa de consulta médica. Dentro de estas los quistes de ovario son las más frecuentes. Alrededor de un 80% son tumores benignos y la mayoría aparecen en mujeres jóvenes. El diagnóstico precoz es casi imposible, se descubren cómo hallazgo casual.

Descripción sucinta del caso

Mujer de 17 años que consulta por distensión abdominal de seis meses de evolución en ausencia de dolor. Menarquia a los 11 años y ciclos menstruales regulares. En la exploración se palpa una gran tumoración redondeada que ocupa casi la totalidad del abdomen no dolorosa. La analítica es normal con marcadores tumorales normales. Radiografía de abdomen normal y en la ecografía: imagen quística dependiente del ovario izquierdo de 20 centímetros. Con el diagnóstico preoperatorio de quiste gigante de ovario se realiza laparoscopia que encuentra una gran formación quística en ovario izquierdo realizándose ooforectomía izquierda. El útero y el ovario derecho no presentan alteraciones. El postoperatorio fue normal encontrándose en la actualidad sin complicaciones. Anatomía patológica: Cistoadenoma seroso de ovario.

Estrategia practica de actuación

La presencia de quistes ováricos es relativamente frecuente en adolescentes, ya que esta patología es más prevalente en mujeres en edad reproductiva. Los tumores grandes suelen ser asintomáticos y se descubren en una exploración abdominal o en una ecografía. En ocasiones, exhiben datos clínicos que los hacen sospechar como el crecimiento lento del abdomen o síntomas compresivos. La laparoscopia ha pasado a ser una alternativa a la laparotomía. Uno de los efectos positivos de la cirugía es el bienestar psicológico, aunque sepan que es benigno al ser operadas comienzan a ser más optimistas, albergando más pronóstico de vida y llegando a pensar que su enfermedad quedo curada por completo.

Palabras-clave empleadas en la búsqueda bibliográfica

Quiste de ovario, Cistoadenoma seroso.

Bibliografía y método empleado para la búsqueda bibliográfica

- 1.Grazyna MB, Malgorzata J, Acrezej M, Marrck N, Marian S.Ovarian cysts in adolescent girls: report of 196 cases. Ginecol Pol. 1998;69: 1218-22
- 2.Gonzalez -Bosquet E, Ibrahim M, Mettler L.Papel de la laparoscopia en la cirugía conservadora de los quistes ováricos. Clin Investiga Gin Obset. 1997; 24:318-21.
- 3.Yuen PM, Yu KM, Yip SK, Lau WC, Rogers MS, Chang A. A randomized prospective study of laparoscopy and laparotomy in management of benign Ovarian más seis. Am J Obstet Gynecol. 1997;177:109