

Incidencia de Neumonía Adquirida en la Comunidad en adultos en Atención Primaria en España (Proyecto NEUMO-ES-RISK)

Vargas Ortega Diego, Rivero Calle, Irene; Pardo Seco Jacobo; Ocaña Rodríguez,; Mascarós Balaguer, Enrique; Redondo Margüello, Esther; Díaz Maroto, Jose Luis; Linares Rufo, Manuel; Molina Paris, Jesús; Gil de Miguel Ángel¹; Jimeno Sanz Isabel; Martinon-Torres Federico y el grupo NEUMOEXPERTOS

OBJETIVOS: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una causa importante de morbi-mortalidad en adultos, incluso en países desarrollados. La incidencia anual de NAC en adultos en Europa es entre 1,07 y 12 por 1.000 personas/año. El objetivo de este estudio es evaluar la incidencia de NAC en adultos en Atención Primaria en España.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo en adultos (>18 años) con NAC diagnosticada y atendida en Atención Primaria en España entre 2008-2013, utilizando el Sistema Nacional de Vigilancia de Datos de Atención Primaria (BIFAP). Protocolo del estudio revisado y aprobado por el CEIC de Galicia, Marzo 2015 (Código de Registro: 2014/623).

RESULTADOS: 51,186 registros de pacientes fueron recuperados y analizados. La incidencia global de NAC en adultos se estimó en 3,53 por cada 1.000 personas/año. La incidencia de NAC aumentó progresivamente con la edad, desde 1,21 a los 18-20 años de edad a 9,96 en mayores de 76 años. De acuerdo con el género, la incidencia global de NAC fue ligeramente superior en hombres (3,91) que en mujeres (3,19);

Sexo	18-65 años	Sexo	>65 años
Varón	Rango (1.35-3.29)	Varón	Rango (6.57-13.76)
Mujeres	Rango (1.07-2.86)	Mujeres	Rango (4.12-7.72)

CONCLUSIONES: La incidencia anual de NAC adultos en Atención Primaria en España es mayor que la reportada para Europa. La incidencia de NAC es comparable entre varones y mujeres hasta los 65 años de edad, a partir de la cual aumenta claramente en varones.