

NO TODOS SON ABSCESOS PARA DRENAR EN PRIMARIA

BELKIS CONSUEGRA MOYA, NOUR SOFIA AL HAJJ RABATT, RICARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LIDYSE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARIA AYUSO CUESTA, CARLA F. BASANTES ACURIO.

GANGRENA DE FOURNIER

Enfermedad infecciosa polimicrobiana, caracterizada por una fascitis necrotizante de la región genital o perianal e incluso la pared abdominal.

EMERGENCIA QUIRÚRGICA LETAL

CASO CLÍNICO

Hombre 66 años

ANTECEDENTES: Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertenso, EPOC, Dislipémico, Hiperuricemia, Alcoholismo, Tabaquismo.

CLÍNICA: dolor testicular de 48 horas y signos inflamatorios. Diagnóstico absceso escrotal, realizan incisión y drenaje más antibióticos orales.

Acude a las 24 horas a consulta de su médico por mal estado general, fiebre, dolor intenso en región testicular. Confusión, hipotensión 67/40, taquicardia 110, gran edema, coloración negro-grisácea con secreción fétida y purulenta en región inguinoescrotal.

DIAGNÓSTICO: Necrosis de Fournier?, Sépsis, Síndrome confusional agudo.

TRATAMIENTO: medidas de soporte y derivación URGENTE a hospital. Ingres a en reanimación para desbridamiento quirúrgico perineal, Orquiectomía izquierda y soporte vital.

Buena evolución. Alta al mes.

Curas locales diarias en su Centro de Salud

Pendiente injerto por Cirugía Plástica

Enfermedad muy rara.

FACTORES PREDISPONENTES más destacables: diabetes mellitus (40-60%) de los casos, y el alcoholismo crónico.

PRONÓSTICO incierto, dependiendo del estado previo del paciente y de la demora de la intervención quirúrgica y del inicio del tratamiento antibiótico.

MORTALIDAD bastante significativa, del 3 al 76% según las series, siendo el denominador común la sepsis.

DIAGNÓSTICO eminentemente clínico aparece primero una simple inflamación del escroto que a continuación, se extiende hasta el perineo, el pene y la pared abdominal, pero no a los testículos, los signos empeoran rápidamente..



ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN

Diagnóstico eminentemente clínico
Esta enfermedad constituye una
emergencia quirúrgica.

SOSPECHAR Y DERIVAR.

Fournier's gangrene in a patient with diabetes



Necrotizing fasciitis of the perineum (Fournier's gangrene) can involve the scrotum. The infection can begin abruptly with severe pain and may spread rapidly.
Reproduced with permission from Lawrence B Stack, MD.

UpToDate®