

CONDILOMAS ANALES Y DIAGNÓSTICO DE VIH

Autores: **Sandra Gonçalves Santiago de Carvalho** ⁽¹⁾. MIR 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Salud Mirasierra. Granada
Ana Martín Fernández ⁽²⁾ MIR 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mirasierra. Granada
Matilde Martín Robles ⁽³⁾. FEA Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mirasierra. Granada
Mª Lourdes García Castillo ⁽⁴⁾. FEA Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mirasierra. Granada
Mª Carmen Muñoz García ⁽⁵⁾ . FEA Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mirasierra. Granada

El Virus de la inmunodeficiencia humana (**VIH**) tiene una prevalencia en la población adulta española de **4 por cada 1000 habitantes**. El virus del papiloma humano (**VPH**) es el responsable de los **condilomas anales**. Es importante realizar el **cribado** de este tipo de enfermedades de transmisión sexual(ETS).

- ❖ Paciente de 32 años, sin antecedentes de interés, que acude a consulta con molestias anales de un mes de evolución, verificando a través de la exploración física que se trataban de **condilomas anales**.
- ❖ Confesó haber mantenido en una ocasión una **relación sexual sin protección** 3 años antes y cerca de un mes tras esta, presentó un **proceso febril** con pérdida de peso, **adenopatías cervicales** y **rash cutáneo** pruriginoso que duró una semana.
- ❖ Ante los hallazgos se solicita analítica en la que destaca una linfocitosis relativa y **serología VIH positiva**.
- ❖ Se deriva a **Medicina Interna**, repitiendo la analítica unos meses después objetivándose una **inmunodepresión severa** y deciden inicio de **tratamiento antirretroviral (TAR)**.
- ❖ En la **citología anal** presenta lesión intraepitelial de alto grado por VPH genotipos 73 y 82, que se interviene por cirugía general.
- ❖ Mantiene **TAR** desde entonces con buen cumplimiento.

- Las **infecciones por VIH y por VPH** son enfermedades de **transmisión sexual** ampliamente relacionadas entre sí, cursando ambas de forma **asintomática** durante años por lo que es importante promover el **diagnóstico precoz**, en especial a las personas con mayor probabilidad de infección por sus **conductas de riesgo**.
- Ante la aparición de enfermedades como los **condilomas anales**, se debe realizar una correcta anamnesis y solicitar serologías de enfermedades de transmisión sexual, derivando a las respectivas especialidades para un **diagnóstico y tratamiento precoces** que permitan evitar así la progresión de la enfermedad.

Bibliografía:

ONUSIDA. Informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de sida. 2012. Disponible en: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/20121120_UNAIDS_Global_Report_2012_with_annexes_es.pdf. Muñoz N. Human papillomavirus and cancer: the epidemiological evidence. J Clin Virol. 2000;19:1-5.