

PREVALENCIA DE EPOC VACUNADOS CON ANTINEUMOCÓCICA

María Ruiz Ruiz, Laura Frutos Muñoz, Miguel Sola García
 C.S El Valle Jaén.

Objetivos

- Conocer el número de pacientes con EPOC tratados con vacuna antineumocócica, independientemente del serotipo vacunal.


Metodología

Estudio observacional transversal.


Se realiza auditoría en base de datos Diraya de los pacientes con diagnóstico EPOC. (Según codificación CIE-9 de “enfermedad pulmonar obstructiva crónica”, “Enfisema pulmonar” y “Bronquitis crónica”)

Prevalencia Vacunación antineumocócica en pacientes EPOC

Vacunados	41 pacientes (27,15%)	33 pacientes (80,48%) Vacuna 23 Valente
		3 pacientes (7,33%) Vacuna 23 valente + 13 valente
		5 pacientes (12,19%) Mal registro
No vacunados	110 pacientes (72,85%)	



Total EPOC
 ■ Vacunados Antineumocócica
 ■ No Vacunados



Vacunados
 ■ Vacuna 23 valente
 ■ Vacuna 23 y 13 valente
 □ Mal registro

Resultados

Ante estos hallazgos podríamos ampliar el estudio para saber el estado real de vacunación en adultos en el resto de pacientes de nuestro centro de salud y así poder determinar si existe una infravacunación, definir las causas y poder realizar campañas de concienciación en estos.