

## Titulo

ROTURA DIFERIDA DE BAZO TRAS POLITRAUMATISMO

## Autores

Pardo Del Olmo Saiz, S.(1); Grande Grande ,R.(2); Santos Urrutia,A(3);Santos Urrutia, V.(4); Del Rivero Sierra,B(5); Piris Santamaria,M.S.(6).

## Centro de trabajo

(1) C.S Camargo interior, Cantabria; (2) C.S Rubayo, Cantabria; (3) C.S Campoo, Cantabria ; (4) C.S Linarejo, Jaen;(5)C.S Ramales,Cantabria;(6) C.S Cotolino I, Cantabria.

## Introducción

Las contusiones abdominales pueden ocasionar daños en los órganos internos .Destacan por su frecuencia las roturas hepáticas y las esplénicas.Las lesiones abdominales en los traumatismos cerrados pueden permanecer latentes varias horas e incluso días apareciendo de forma diferida los síntomas .

## Descripción sucinta del caso

Varón de 44 años que acude a urgencias tras traumatismo de moto frontal sin pérdida de conocimiento con contusión abdominal y pierna izquierda. En resonancia magnética de rodilla izquierda se observa una fractura tibial de rodilla tipo I Moore.En el scanner de abdomen aparece una laceración hepática y contusión esplénica.Se realiza intervención quirúrgica de rodilla con buena evolución con vigilancia del hematoma hepático y ante la ausencia de sangrado,se decide el alta a su domicilio.A los ocho días del alta el paciente presenta síncope con recuperación de conciencia y seguidamente dolor abdominal,afectación del estado general,e hipotension,por lo que se decide derivarle a urgencias donde se le realiza un scanner abdominal con hemoperitoneo y hematoma subcapsular esplénico con diagnóstico de rotura diferida con signos de sangrado activo.Se realizó esplenectomía con evolución favorable.

## Estrategia practica de actuación

El bazo se lesiona con frecuencia en accidentes de tráfico bien sea por mecanismos de compresión,de tracción o mecanismos de contusión y aplastamiento que producen laceraciones.Estos pueden inducir la formación de un hematoma que puede permanecer asintomático y reabsorberse o ir creciendo y romperse tras un cierto tiempo.La rotura esplénica traumática es un cuadro clínico frecuente y de extrema gravedad que puede provocar la muerte del sujeto ,incluso de manera diferida ,por lo que es fundamental hacer un diagnóstico diferencial y tener presente la posibilidad de una rotura en dos tiempos,por la velocidad de deterioro del paciente.

## Palabras-clave empleadas en la búsqueda bibliográfica

Rotura esplénica,hemoperitoneo,traumatismo abdominal.

## Bibliografía y método empleado para la búsqueda bibliográfica

- 1.Schwartz PE,Sterioff S,Postesplenectomy sepsis and mortality in adults.Jama.1982;248:2279-82.
- 2.Bejarano M,Lenis GA.Hallazgo frecuente de patologías infrecuentes de bazo.Rev Colombia Cirugía.2001;16:202-10.
- 3.Sibon Olano A,Quesada MC,Martínez García P,Martínez Sánchez MC,Martínez Pérez Crespo DM y Vizcaya Rojas MA.Rotura de bazo en dos tiempos.Cuad.Med.forense vol 19 n 3-4.Málaga Jul-dic 2013.