

TRES MESES PARA OLVIDAR, LA GUERRA CON LA SÍFILIS.

AUTORES: ESTRADA MENÉNDEZ, ADRIÁN; ARIAS ARIAS CAYETANA; OLAYA VELÁZQUEZ, INÉS; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JESSICA; DÍAZ GONÁLEZ, ELOY; VIDAL TANAKA, SARA.

Introducción: La **sífilis** es una **enfermedad de transmisión sexual** causada por la *Treponema Pallidum*. Distinguimos **primaria, secundaria y terciaria**. Suele iniciarse como una única **llaga indolora a nivel genital y progresa** con fiebre, dolores o fatiga hasta poder presentar problemas cardiacos y del sistema nervioso.

Descripción del caso: **Varón de 38 años**. Fumador. **No practicas sexuales de riesgo**. Acude por **fiebre** vespertina de hasta 39°C ocasionalmente, de tres meses de evolución asociada a tiritona, sudoración profusa y cefalea frontal. Al inicio, odinofagia y tos con expectoración. Desde hace una semana, **lesiones cutáneas** maculares, eritematosas y ligeramente violáceas, no pruriginosas, en tronco y raíz de miembros. Adenopatías submandibulares y laterocervicales, dolorosas a la palpación. Además de aftas orales, pequeñas y dolorosas, así como leve astenia y anorexia.

Tras realizar diversas pruebas de laboratorio e imagen, se observa una ligera elevación de la PCR, VSG y pruebas de función hepática. Un pequeño nódulo a nivel intercostal bajo. Una discreta hepatomegalia. Un ligero hidrocele. Y sobretodo una **serología luética positiva (Sífilis secundaria)**. Resolviéndose todo ello, tras pauta antibiótica.

Estrategia práctica de actuación: Se inicia tratamiento con **Penicilina G 4 millones unidades cada cuatro horas**, intravenosa, durante **14 días**. (La sífilis puede tratarse con antibióticos, como Doxiciclina, Penicilina G o Tetraciclina (alérgicos a Penicilina), y la duración del tratamiento depende de la magnitud de la enfermedad y las comorbilidades del paciente.

Realizar exámenes sanguíneos de **control a los 3, 6, 12 y 24 meses** para asegurarse de que la infección desaparezca, usando **preservativos hasta que dos exámenes hayan sido negativos**. **Evitar el contacto sexual cuando el chancro está presente**.

Se **debe tratar a todos los compañeros sexuales** ya que es extremadamente contagiosa en las fases primaria y secundaria.

Bibliografía: U.S. National Library of Medicine. Sífilis [Internet] U.S; 2016 [Consultado el 22 de Marzo de 2016]. Disponible en: <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/syphilis.html>

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principios y Práctica de Enfermedades Infecciosas. Ed 6. London: Churchill Livingstone; 2005:2274-2276.

Tramont EC, Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. *Treponema pallidum* (syphilis). Principles and Practice of Infectious Diseases. Ed.7. Philadelphia: Elsevier; 2009. Capítulo 238.