ADENOPATIA AXILAR Y FIEBRE:BUSQUEMOS LOS TRES PIES AL GATO

M. Herranz; J. Morales;J.M. Carmona; A. Fabra;E. Pablos; M. Iglesias

Institut Català de la Salut

La enfermedad por arañazo de gato es un proceso infeccioso benigno que se produce a causa de un arañazo o lamido de gato. El diagnóstico se establece con tres de los siguientes criterios: contacto previo con gatos y lesión dérmica u ocular previa, pruebas cutáneas para enfermedad por arañazo de gato positivas, exclusión de otras causas de adenopatías y biopsia ganglionar con histología característica.También es posible realizar pruebas serológicas para la detección del DNA de la Bartonella.

Hombre de 20 años de edad con fiebre y adenopatía axilar derecha de 6 cms, dolorosa, blanda, adherida a planos profundos y con eritema en la piel que lo recubre. La biopsia descartó proceso linfoproliferativo. Como antecedente, había un arañazo de gato hace un mes en el antebrazo derecho con una lesión pustulosa. También había en la región interescapular una adenopatía dolorosa, poco movible de 8 cms .La analítica fue anodina y la biopsia reveló una linfadenitis crónica con focos pionecrotizantes diseminados. Fué diagnosticado de enfermedad por arañazo de gato, siendo tratado con eritromicina durante 10 días y se comprobó la resolución total del cuadro