



Métodos empleados en los intentos autolíticos atendidos por dos dispositivos móviles de urgencias, rural y urbano.



Objetivos:

Comparar los casos de intentos de autolisis atendidos por los dispositivos móviles de urgencias pertenecientes a dos Unidades, una ubicada en zona urbana y otra en zona rural, ambas en la misma provincia, Cádiz.

Metodología:

Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal. En el tamaño de la muestra están recogidos todos los casos de intentos de autolisis atendidos por los dos dispositivos móviles de urgencias entre los meses de Octubre a Diciembre de 2013. De las historias clínicas recogimos las siguientes variables: sexo, edad, historia psiquiátrica previa, intentos de autolisis previos, y el método utilizado para tal intento, tanto en medio rural como urbano. Los datos se analizaron con el programa SPSS 20.0

AUTORES:

SANCHEZ ALEX, María Dolores. MF UGC Vejer de la Fra (Cádiz)
 RIVERA PEREZ, María Dolores. MF UGC Bahía de Cádiz (Cádiz)
 ARAGÓN MERINO, Amalia María. R2 MF,CS Zona Centro (Cáceres)
 SANCHEZ BENITEZ, Jose Antonio. MFUGC Puerto Sta María Sur (Cádiz)
 GUERRERO PONCE, Juan Pedro. MF UGC La Merced (Cádiz)
 ESCRIBANO TOVAR, Angela del Carmen. R2 MF UGC La Merced (Cádiz)



MEDIO RURAL



MEDIO URBANO

Resultado:

Se atendieron en total 20 pacientes por este motivo, 35% hombres. En el ámbito urbano repartidos equitativamente hombres y mujeres, mientras que en el rural, el 100% fueron mujeres. En el ámbito urbano el 35 % tenían intentos previos, mientras que en el rural el porcentaje fue del 66 %. En ambos, el 65% de los pacientes contaba con historial psiquiátrico previo y se concentraba entre los 30 y 50 años, el 66 % de los pacientes. En el ámbito rural, el 66 % de los casos utilizaron métodos físicos, siendo el resto por ingestión medicamentosa, mientras que el ámbito urbano, sólo el 14% fue a través de métodos físicos y el resto por ingestión medicamentosa.

Conclusiones:

Se constata que la edad media predominante es similar en ambos ámbitos, el urbano y el rural, al igual que no existen diferencias significativas en los porcentajes de pacientes en los que existía historial psiquiátrico previo. Se observa una gran diferencia en lo que a los métodos usados se refiere, siendo predominante en el ámbito rural los métodos físicos, frente a la ingestión de medicamentos en el ámbito urbano.

MÉTODO DE AUTOLISIS



MEDIO RURAL



MEDIO URBANO

