Uso de los inhibidores de la DPP-4 en una Comunidad Autónoma durante el año 2014

Pérez Martín A(1). Gutiérrez Revilla JI(2), Agueros Fernández MJ(3), López Lanza JR(1), Rodríguez Porres M(3), Pérez Hernández F(2)
(1)Cs Centro. Santander. (2)Farmacia Gerencia Atención Primaria Santander. (3)Cs Zapaton. Torrelavega.

Objetivos: Análisis de las dispensaciones de los inhibidores de la DPP-4 realizadas en una comunidad autónoma durante un año.
Metodología: Estudio de todas las dispensaciones de los inhibidores de la DPP-4 realizadas durante el año 2014 en Cantabria (588.656 habitantes), valorando su repercusión final sobre el gasto.
Resultados: Los inhibidores de la DPP-4 han supuesto el 4.24% del gasto total con 6688899.11 euros y el 23,65% de las prescripciones totales realizadas para la diabetes. Por coste la sitagliptina con 608180.93 euros es el mayor, seguido de linagliptina (370850.70), vildagliptina (297671.43) y saxagliptina (104570.55); por asociaciones metformina con vildagliptina fue la mayor (2534083.79 euros) seguido de la asociación con sitagliptina (2369215.61), con linagliptina (278213.51) y con saxagliptina (126112.59). La dosis/1000habitantes/mes (DHM) para sitagliptina es de 43,72 euros (asociación con metformina 154.07), linagliptina de 26.37 (asociación con metformina 27.62), vildagliptina de 19.8 (asociación con metformina 525.37) y saxagliptina de 7.44 (asociación con metformina 24.71).
Conclusiones: Los inhibidores de la DPP-4 son fármacos muy utilizados en el manejo de los diabéticos, casi un 25% lo tienen prescrito, sin embargo no significa un coste muy grande del total farmacológico de la enfermedad, suponiendo un 10% del total de los tratamientos para la diabetes.