




## PRESCRIPCIÓN DE ANTIDEPRESIVOS EN UN CENTRO DE SALUD URBANO

Antón Trigo González<sup>1</sup>, Ana Pérez Santamaría<sup>1</sup>, Cristina de Manueles Astudillo<sup>1</sup>, Álvaro Morán Bayón<sup>1</sup>, Natalia Diego Mangas<sup>1</sup>, Mercedes Bernad Vallés<sup>2</sup>.

**Objetivos:** Conocer y analizar la prescripción de los antidepresivos (AD) en los pacientes del Centro de Salud (CS) San Juan de Salamanca, todo ello desde la perspectiva de la mejora en la prescripción farmacológica.

**Metodología:** Se realizó una revisión bibliográfica teórica de los AD descritos y de su utilización en diversas patologías enfocado desde un punto de vista de la Atención Primaria. Criterios de inclusión: Pacientes adscritos al CS San Juan, a los que en enero de 2013 se les haya prescrito un fármaco AD, que continúen activos en el registro informático Medora. Diseño de la base de datos para la recogida de información garantizando el anonimato de los usuarios. Recogida de datos mediante revisión de la historia clínica electrónica, no se contactó directamente con los pacientes. Análisis descriptivo retrospectivo de los diferentes tipos de antidepresivos prescritos en el CS de San Juan en dicho mes.



**Resultados:** Del total de 500 pacientes incluidos, se pierden un total de 26 (5.2%), por cierre de su historia clínica. Sexo: 120 varones (25.3%) 354 mujeres (74.7%) Edad: media de 67.25 años, mínimo de 15 años y máximo de 102 (rango 87 años) y mediana de 69 años. Tipo de AD: citalopram 32, escitalopran 129, fluoexetina 45, paroxetina 56, sertalina 33, venlafaxina 76, duloxetina 52, mirtazapina 58, bupropion 10, mianserina 27, trazodona 28, reboxetina 3, agomelatina 10, fluvoxamina 4, amitriptilina 3. Número de AD: 370 usuarios tenían prescrito solo un AD (79.4%) 93 usuarios dos AD (20%) y 3 usuarios tenían prescritos 3 o más AD (0.6%)

**Comentario:** Con esta investigación pretendemos conocer las características de los usuarios de nuestro centro de salud a los que se le prescriben fármacos antidepresivos, mejorar el uso de estos fármacos y tratar de adecuar su prescripción. Los resultados obtenidos se corresponden con la bibliografía consultada, con un perfil de usuario mujer en sexta década de vida y el predominio de uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como fármacos más empleados.