

SARNA NORUEGA EN UN PACIENTE INSTITUCIONALIZADO.

Autores: DIAZ VERA ALCIBIADES(1); RODRIGUEZ FERNADEZ BLANCA(2); KOSTYRYA TETYANA(3); DALLE DALE ABDALLAH JAMIL(4); REYES MATEO CARMEN ANTONIA(5); BLANCO SIENDONES LORENA(6).

Centro de Trabajo: (1), (2), (4), (5) Y (6): SERVICIO CANTABRO DE SALUD. CANTABRIA; (3): CENTRO DE SALUD CARTAGENA CASCO . MURCIA.

Introducción:

La sarna es una infestación por ectoparásitos del ácaro hembra grávida de *Sarcoptes scabiei* var. *hominis* (1). La sarna afecta a todas las razas y clases sociales en todo el mundo y se observa en pacientes con anestesia sensorial, deterioro mental, incapacidad física, e inmunosuprimidos (1)

Descripción sucinta del caso

Varón de 80 años institucionalizado con antecedentes de demencia senil, hipertensión arterial y diabetes. Acude a la consulta por picor intenso y lesiones generalizadas, que fueron tratadas como impétigo. Ante la mala evolución del cuadro clínico es derivado a urgencias hospitalarias. El paciente ingresó con diagnóstico de infección urinaria y de lesiones generalizadas en posible relación al diurético tiazídico e inician tratamiento con corticoterapia, antihistamínicos y cremas hidratantes. Veinte días después del alta acude a la consulta de primaria por empeoramiento del cuadro cutáneo y aparición de nuevas lesiones cutáneas en zonas de axila, ingle e interdigital y placas hiperqueratósicas. La clínica del paciente y las pruebas de laboratorio confirma el diagnóstico de Sarna Noruega. Se decide iniciar tratamiento con ivermectina y permetrina presentando mejoría de las lesiones.

Estrategia práctica de actuación:

Cualquier paciente no diagnosticado o con un tratamiento incorrecto puede ser foco de un brote epidémico de sarna. El deterioro inmunológico predispone a la reinfestación. Las enfermedades mentales, enfermedades sistémicas crónicas, alcoholismo, diabetes y enfermedades que afectan al sistema inmune son factores de riesgo que predisponen a la sarna noruega. Ante todo paciente institucionalizado e inmunosuprimido por la diabetes con lesiones cutáneas que no mejora con el tratamiento inicial instaurado se debe sospechar la Sarna Noruega como una posible causa. Por tanto, una vez diagnosticado un paciente o ante la sospecha clínica, se tomarán las medidas preventivas y de desinfección.

Palabras clave empleadas en la búsqueda bibliográfica

Norwegian scabies and erythroderma.PubMed.

Bibliografía:

1.- Das A, Bar C, Patra A. Norwegian scabies: Rare cause of erythroderma.Indian Dermatol Online J. 2015 Jan-Feb;6(1):52-4.