

¿POR QUÉ ME ESTÁ CRECIENDO ESTA CICATRIZ?

García Sanfilippo, María Dolores. San Pedro Ortiz, Nuria Esther. Olavarría Ateca, Valvanuz. Rodríguez Porres, Mariano. Bonnardeaux Chadburn, Cristina.

Introducción:

El dermatofibrosarcoma protuberans es un tumor de malignidad intermedia, con bajo poder metastásico y crecimiento lento e indoloro. Se caracteriza por una invasión local subclínica y agresiva, con alto índice de recidivas locales. El único tratamiento curativo es la cirugía con amplio margen de escisión.

Descripción sucinta del caso:

Varón de 41 años, sin enfermedades previas de interés. Desde los 16 años, cicatriz-marca en el muslo izquierdo en su tercio superior, que desde hace un año comienza a crecer y a cambiar su coloración, apareciendo múltiples nodulaciones induradas de distintos tamaños y de color pardo rojizo; una de ellas está pediculada, multilobulada, mide aproximadamente 7 centímetros y su superficie está necrosada. Derivado con urgencia al servicio de Dermatología, solicitan analítica general, que resulta normal, y realizan biopsia de la zona, cuyo resultado anatomopatológico nos confirma el diagnóstico. Se realiza cirugía con exéresis de la lesión con un margen de 4 cm y, posteriormente, se remite al servicio de radioterapia para tratamiento complementario. Han pasado 6 años desde la intervención, y el paciente no ha tenido recidivas hasta el momento.

Estrategia práctica de actuación:

En atención primaria, ante cualquier lesión o mancha cutánea debemos realizar controles periódicos, y en el momento en el que observemos cambio de color, forma o tamaño de la misma, debemos derivar al servicio de Dermatología, quien valorará las pruebas complementarias correspondientes, y si es necesario exéresis y biopsia de la misma. En muchas ocasiones, sólo podemos obtener el diagnóstico definitivo con la biopsia de la lesión, como es el caso que nos ocupa, aunque siempre en este tipo de patologías, debemos pensar como diagnóstico diferencial, en un melanoma, en metástasis cutáneas, en un linfoma, un fibrosarcoma, cicatrices hipertróficas, queloides y un dermatofibroma.

Palabras-clave empleadas en la búsqueda bibliográfica:

Dermatofibrosarcoma protuberans, Nódulo indurado, Cirugía, Recidivas.

Bibliografía y método empleado para la búsqueda bibliográfica:

1. Morris H. Dermatofibrosarcoma protuberans. J Am Acad Dermatol 1996;35:355-37. 2. Rook A, Ebling F, Wilkinson D et al. Tratado de Dermatología. Barcelona: Ediciones Doyma 1989; pág 2669-72. 3. Rutgers EJ, Kroon BB, Albus-Lutter CE. Dermatofibrosarcoma protuberans: Treatment and prognosis. Eur J Surg Oncol 1992;18:241-8. 4. Johnson-Jahangir H, Ratner D. Advances in management of dermatofibrosarcoma protuberans. Dermatologic Clin 2011;29:191-200.