

LINFADENITIS POR ARAÑAZO DE GATO. CASO CLÍNICO.



(1) Aurora Santamaría Godoy; (2) Sana Maadi Ahmed; (3) Fátima García Martínez; (4) María Rosa Gil Fernández; (5) Javier Sandoval Codoni
(1) Médico de familia, centro de salud Cruz de Caravaca, Almería. (2) Residente de familia de 4º año, Centro de salud de la Mojonera, Almería. (3). Médico de familia, centro de salud Virgen del Mar, Almería. (4) Médico de familia La Mojonera, Almería (5) Médico de familia, centro de salud de Roquetas de Mar, Almería..

INTRODUCCIÓN:

La enfermedad por arañazo de gato es una entidad infecciosa producida por bartonella henselae, cuyo reservorio natural es el gato o el perro. Es una de las causas más frecuentes de linfadenitis localizada dolorosa crónica.

DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL CASO:

Paciente mujer de 12 años que acude por inflamación en codo y axila izquierda de dos semanas de evolución que ha comenzado con febrícula y malestar general 3 días antes. En el domicilio conviven con un gato y un perro.

En la exploración destaca nodulación en codo izquierdo de 1,5 cm de diámetro y dos nodulaciones en axila izquierda de 2 y 3 cm de diámetro, con empastamiento. Compatibles con adenopatías.

Se solicita analítica en la que destaca leucocitosis con 12.8, linfocitos 5.8, monocitos 11. Serología para virus de Epstein-Barr, hepatitis A, B y C y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue negativa. Brucela y toxoplasma negativo. Anticuerpos anti Bartonella henselae en suero Positivo IgG e IgM. Hemocultivo negativo.

Ecografía axilar con adenopatías en codo y axila con imágenes sugestivas de abscesificación.

Test de la tuberculina negativo, radiografía de tórax normal.

ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN:

Ante un cuadro de linfadenitis con sintomatología general es fundamental una buena anamnesis para orientar el cuadro clínico. Muchas enfermedades se acompañan de adenopatías. Cuadros de duración inferior a 2-3 semanas orientan a infecciones virales o bacterianas y los superiores a un mes lo hacen hacia cuadros tumorales o tuberculosis.

Ante una linfadenitis localizada con antecedente de contacto con gatos, debemos pensar en esta enfermedad. La confirmación es a través del cumplimiento de 3 de criterios de Margileth: Contacto con gato, pruebas de laboratorio negativas para otras causas de adenopatías, la identificación de Bartonella henselae de forma indirecta por título positivo de IgG o IgM.

PALABRAS CLAVE : Bartonella henselae, zoonosis, linfadenitis

BIBLIOGRAFÍA:

Palmieri O, Corti M. Enfermedad por arañazo de gato. Enf Emerg 2009;11(3):146-148
Cleri DJ, Ricketti AJ, Vernaleo JR. Fever of unknown origin due to zoonoses. Infect Dis Clin North Am 2007;21:963-996.
Chomel B, Boulouis H, Muruyama S, Breitschwerdt E. Bartonella spp. in pets and effect on human health. Emerg Infect Dis 2006;12:389-394