

¿SEGURO QUE LA OPERARON DE ESO?

ID 927

Quesada Martínez, MC; Medina Abellán, MD; García Palacios, M; Sánchez Fernández A; Del Cerro Alvarez N; Pereñiguez Barranco JE.

INTRODUCCIÓN

- Los trastornos tiroideos son frecuentes en todas las edades.
- Sus manifestaciones clínicas son diversas, con frecuencia de instauración insidiosa y el diagnóstico suele retrasarse

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN

- ✚ El BMN es la 2ª causa más frecuente de hipertiroidismo.
- ✚ Proceso de desarrollo lento. Uno o varios nódulos desarrolla autonomía funcional.
- ✚ Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 40-50 años.
- ✚ Nuestro caso es más extraño dados los antecedentes quirúrgicos de la paciente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 56 años intervenida de estrabismo y tiroidectomía total hace 30 años.

En tto con Levotiroxina 100 mcg → TSH inhibida
→ Se disminuye dosis → ¿TSH inhibida?

A LA INSPECCIÓN



EN ECOGRAFÍA



GAMMAGRAFÍA



Se inician betabloqueantes por clínica de hipertiroidismo + tiamazol.

Se propone para cirugía