

CASO CLÍNICO DE SEGUNDO Y TERCER MOLAR INFERIOR IZQUIERDO IMPACTADOS.

AUTORES

Miguel Martinez Eva M^a, Miguel Martinez Armando, Martinez Nie to Rosa, Miguel Zubieta Manuel, Lencero Abad Cristina, Fernandez Hernaez Consuelo

Introducción

Se denominan dientes retenidos o impactados a aquellos que una vez llegada la época normal de su erupción, quedan encerrados dentro de los maxilares manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico.

Las retenciones dentarias pueden ocasionar diversas complicaciones.

Descripción sucinta del caso

Varón de 17 años de edad que acude a la consulta aquejado de dolor de moderada intensidad en la hemiarcada inferior izquierda, el dolor está asociado al consumo de alimentos fríos o calientes y cuando la paciente reclina hacia abajo la cabeza.

Examen clínico:

El primer molar permanente del lado afectado presenta caries en la superficie distal y es ligeramente doloroso.

El segundo molar está parcialmente impactado en una posición mesio-angular.

El tercer molar no está presente .

Después de haber concluido el examen clínico y radiográfico se emiten los siguientes diagnósticos:

Pulpitis aguda irreversible en el primer molar inferior izquierdo.

Segundo y tercer molar inferior izquierdo impactados.

Se explica las opciones de tratamiento al paciente y este decide la extracción del segundo molar inferior izquierdo, endodoncia del primer molar y seguimiento del tercer molar.

Estrategia práctica de actuación:

Se debe estudiar bien el caso, para poder ofrecer las distintas opciones de tratamiento al paciente y a sus padres (por ser éste menor de edad), explicando detalladamente la técnica, la repercusión futura a nivel de la cavidad oral que se puedan derivar de las actuaciones, el tiempo para conseguirlo y el coste económico en caso de precisar técnicas que no se encuentran en la cartera de servicios, y con todo esto puedan decidir lo que consideren más óptimo para ellos (paciente y familiares).

Palabras-clave empleadas en la búsqueda bibliográfica

Dientes impactados, mesioangular, odontosección, pericoronaritis.

Bibliografía y método empleado para la búsqueda bibliográfica

Garmendia-Felipe AM, González-Longoria R, Clausell-Ruiz M, Bastarrechea M, Correa-Mozo B. Retención dentaria. Rev Cubana Ortod. 2000; 15 (2):82-5

Bernal-Gómez AP, Archila-Celis DL, Dorado-Villamil MF. Terceros molares incluidos. Epidemiología y contexto sistémico. Rev Fed Ondontol Colombia. 2003; 206:17-25.

Morán López, E; Cruz Paulin Yulien. Pericoronaritis. Criterios actuales. Revisión bibliográfica. Rev Cubana Estomatol v.38 n.3 Ciudad de La Habana sep.-dic. 2001.