

ANCIANOS Y FRACTURA VERTEBRAL POR OSTEOPOROSIS: UN ENFOQUE INTEGRAL

Sierra Martínez, Iker; Sierra Martínez, Leticia; Martínez Fuerte, Rosario; Díez Suárez, L.Alfonso; Sanz González, Natalia


Sacyl – Valladolid Este

OBJETIVO



Conscientes de la importancia de tener un buen registro en la historia clínica (HC), para el seguimiento y control de los pacientes. Nos propusimos evaluar la calidad del registro de pacientes con fractura osteoporótica vertebral.

DISEÑO



Los autores realizaron un estudio descriptivo transversal aplicado a una selección de pacientes escogidos por muestreo no probabilístico consecutivo, del listado de pacientes con diagnóstico Osteoporosis (OP) que han presentado la complicación Fractura Vertebral (FV), con registro en la Historia Clínica Informática del Centro de Salud.

MÉTODO

PREVALENCIA E LA FRACTURA VERTEBRAL OSTEOPORÓTICA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE REGISTROS EN LA HISTORIA CLÍNICA INFORMÁTICA:

Metodología: Revisión retrospectiva mediante Audit de la HC.

Registro y análisis en hoja Excel.



Resultados:

Cumplimiento criterios 2015.

Marco: Un centro de salud urbano. Castilla y León. España.

Población y Muestra:

Los pacientes > 50 años (en total acuerdo con los criterios de inclusión, año 2016 con fractura osteoporótica vertebral (FVO).



Tratamiento de Datos: Se recogen en una hoja de cálculo Excel y se analizan mediante el programa SPSS 9.0 para Windows®.

RESULTADOS

El riesgo de la fractura relacionada con la osteoporosis para las personas mayores de 50 años de edad fue de 16,7% en hombres y 31,9% en mujeres.

El riesgo de fractura osteoporótica vertebral fue del 6,2% en los hombres y de 6,6% en las mujeres.

CONCLUSIÓN

El análisis de los registros de FVO, nos hace tomar conciencia de la importancia en el control del paciente con osteoporosis. El registro nos permite evidenciar mejoras en el proceso de atención. Al analizar los resultados de nuestra revisión, decidimos programar una coordinación multidisciplinar de atención, intra y extra-hospitalaria en el cuidado de los ancianos con FVO ayudará a disminuir la morbi-mortalidad por complicaciones asociadas a la FVO.