

Tumor filoide de mama

Vena, Maria, Bermudez Torres, Fidela Maria, Salva Ortiz, Nerea

Introducción:

Los tumores filoides (TF) son tumores de mama poco comunes que se originan en el tejido conectivo. Son más frecuentes en mujeres de 30 a 49 años de edad, aunque pueden presentarse en mujeres de cualquier edad. La mayoría son benignos, pero aproximadamente 1 de cada 10 de estos tumores son malignos.

Descripción sucinta del caso:

Presentamos el caso de una mujer de 39 años, multípara, con dos embarazos a término sin otros antecedentes de interés, que de forma súbita presenta tumoración en cuadrante interior superior de mama derecha con crecimiento rápido en seis meses. Acude a consulta, donde se realiza ecografía y mamografía. En la mamografía se aprecia masa tumoral bien delimitada de 3 por 4 centímetros (cm) y en la ecografía se aprecia masa de características fibrosas. Se procede a biopsia guiada extrayendo cilindro con resultado anatomopatológico de tumor filoide probablemente benigno de mama. Se programa intervención quirúrgica con tumorectomía con margen de seguridad con postoperatorio favorable. Es dada de alta con controles semestrales.

Estrategia practica:

El tumor TF de la mama es una patología poco frecuente y origen desconocido. A pesar de su clasificación en benignos, borderline y malignos, su comportamiento tiende a ser incierto y hay que hacer el diagnóstico diferencial con fibroadenomas y tumores malignos. Debido a esto su tratamiento sigue siendo controversial. El diagnóstico se realiza mediante biopsia de toda lesión nodular sospechosa, idealmente una biopsia core bajo apoyo ecográfico. El tratamiento es quirúrgico. La recidiva suele ocurrir dentro de los primeros dos años posteriores a la cirugía. Las metástasis suelen ser raras y el pronóstico depende del tamaño y del grado de infiltración en el momento del diagnóstico.

Palabras clave: Tumor filoides, cistosarcoma filoides, mama.

Bibliografía:

1. Barrio AV, et al. Clinicopathologic Features and Long-Term Outcomes of 293 Phyllodes Tumors of the Breast. *Ann Surg Oncol* 2007; 14: 2961-2970.
2. Guerrero MA, et al. Malignant phyllodes tumor of the breast: review of the literature and case report of stromal overgrowth. *Surg Oncol* 2003; 12: 27-37.
3. Lenhard MS, et al. Phyllodes tumour of the breast. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2008; 138: 217-221.