

# ROTURA TENDINOSA POR QUINOLONAS: UN EFECTO INDESEADO

Laura López Álvarez (1), Blanca García López (1), Cristoina Villalibre Calderón (2), Nuria Fernández Sobredo (3), Ana Ruiz Álvarez (3), Marta Álvarez Megido (1)

(1) Médico de Atención Primaria área III, Avilés, Asturias. (2) Médico de Urgencias Hospital San Agustín, Avilés, Asturias. (3) Médico Interno Residente área III, Avilés, Asturias

Varón 83 años  
HTA  
Enfermedad renal crónica grado 3b  
Polimialgia reumática tratada con Prednisona 5mg/día

Fiebre, tos y crepitantes basales derechos  
Rx tórax objetiva NEUMONÍA  
Se trata con **LEVOFLOXACINO** (ajustado a función renal)

A los dos días...

**IMPOSIBILIDAD PARA LA DEAMBULACIÓN**  
**ROTURA DE TENDÓN DE AQUILES BILATERAL**



- **ADVERTIR** AL PACIENTE A TRATAMIENTO CON QUINOLONAS: ANTE DOLOR TENDINOSO CONSULTAR
- PRECAUCIÓN EN PACIENTES A TRATAMIENTO CRÓNICO CON **CORTICOIDES**: AUMENTA RIESGO
- PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON **ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA**: AUMENTA EL RIESGO

REFLEXIONES... CÓMO MINIMIZAR RIESGOS