SÍNDROME DE SWEET

El síndrome de Sweet, o dermatosis neutrofílica aguda febril esta caracterizado por inicio agudo de fiebre, leucocitosis, y placas eritematosas infiltradas por neutrófilos. La causa más frecuente es idiopática, aunque puede estar causada por neoplasias, fármacos o infecciones.

Mujer de 85 años de edad. Acude a consulta por presentar desde hace dos semanas una erupción ligeramente pruriginosa. Presenta en la cara, en ambas zonas parietales, sienes, totalidad de pabellones auriculares, cara lateral y anterior de cuello, así como de forma aislada en los hombros y los antebrazos, placas eritemato-edematosas de tamaño variable (2-10 cm) con bordes ligeramente sobreelevados. Refiere episodios similares meses atrás. Tras tratamiento con corticoides orales y antihistamínicos, y ante la falta de mejoría, se deriva a dermatología, donde le realizan analítica y biopsia de las lesiones. La analítica es normal, y en la biopsia se hayan numerosos polimorfo nucleares neutrófilos intravasculares, algunos pocos muy aislados intersticialmente, aunque no acompañados de eosinófilos.

El síndrome de Sweet es una urticaria neutrofílica, en principio benigna, pero que en determinadas ocasiones puede esconder debajo una enfermedad más grave como neoplasias o síndromes autoinmunes. El diagnóstico es confirmado por biopsia, aunque se debe sospechar por la clínica. Se inició tratamiento con dapsona, dada la inefectividad de los corticoides en este caso.

Sweet, urticaria, neutrofilia

1.- Callen JP. Dermatosis neutrofílica. Dermatol Clin 2002;20:409. 2.- James WD. Dermatosis neutrofílica. Arch Dermatol 2003;139:1014. 3.- Cohen PR. Dermatosis neutrofílicas: una revisión de las opciones de tratamiento actuales. Am J Clin Dermatol 2009;10:301.