

MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ANEMIA FERROPÉNICA EN NUESTRO CENTRO DE SALUD

Autores: Dus , R; Serrano Noguera, A; Casas Torres, A; Medina Abellán, MD; Hernández Martínez, C; García Palacios, M.

OBJETIVOS: Comprobar cumplimentación del algoritmo diagnóstico, de actuación y seguimiento en la consulta del MAP. Estudiar la adecuación del tipo de tratamiento y duración del mismo según recomendaciones.

Es el tipo de anemia más frecuente en la población general. Se trata de una anemia caracterizada por la disminución o ausencia de los depósitos de hierro, baja concentración de hierro sérico, baja saturación de transferrina y baja concentración de la hemoglobina (Hb) o del hematocrito.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, transversal, observacional.

Se incluyeron 168 pacientes mayores de 14 años diagnosticados de anemia ferropénica (CIAP B-81) durante el año 2012 – 2013.

Las variables:

- Diagnósticas (edad, sexo, analítica diagnóstica y de control)
- Etiológicas (Ac. Anti-Transglutaminasa, SOH, sangrados previos, malabsorción)
- Tratamiento (Derivación especialista, tipo y duración tratamiento)

RESULTADOS

