Carcinoma espinocelular facial recidivante

El carcinoma espinocelular (CEC) es el segundo tumor cutáneo maligno en frecuencia, es más frecuente que el basocelular en algunas localizaciones como las manos. La etiología del carcinoma espinocelular es multifactorial . La extirpación quirúrgica de la lesión es el tratamiento de elección.

Carmona Calderón M, Rodríguez Díaz JL, Toro Calvente F, Alcántara Montero A

Centro de Salud de Santa Amalia

BADAJOZ

CASO CLÍNICO

Varón de 79 años, hipertenso, de piel clara, con pecas y ojos azules, agricultor de profesión ya jubilado. Acude porque hace cuatro meses se notó una lesión facial y preauricular derecha que le ha ido aumentando de forma progresiva . Refiere que es la tercera lesión similar que le ha salido en la cara en los últimos años y siempre se las han tenido que intervenir en Dermatología. A la exploración se observa un nódulo grande, vegetante, de 2,2 cms de diámetro, en la zona preauricular derecha, con áreas de hiperqueratosis y ulceración. Está indurado y adherido a planos profundos. Fue remitido de nuevo a Dermatología siendo diagnosticado, tras biopsia, de carcinoma espinocelular de alto grado debido a su tamaño. No estaba extendido localmente ni a distancia. Fue intervenido mediante excisión quirúrgica controlada mediante microscopio (cirugía de Mohs) dejando de margen 6 mm de piel sana.

ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN

La etiología del carcinoma espinocelular es multifactorial. Entre los factores individuales destacan el sexo, tipo de piel , la edad. Es más frecuente en varones, de fototipo dermatológico I-II (piel clara, pelo rubio) y de edad avanzada. El envejecimiento cronológico de la piel facilita, por sí mismo, la aparición de malignidad . Factores ambientales: radiación solar, radiaciones térmicas. Su manifestación clínica típica suele ser un tumor que se presenta como una pápula o un nódulo indurado carnoso con hiperqueratosis y/o ulceración. La extirpación quirúrgica de la lesión es de elección. La cirugía controlada mediante microscopio, o cirugía de Mohs es útil en tumores de alto riesgo.

SEMG
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia