

# Perfil del paciente Diabético tipo2 atendido en los Servicios de Urgencias por complicaciones agudas diabéticas



## ➤ Objetivos

Conocer características sociodemográficas y clínicas de los DM2 atendidos por complicaciones agudas diabéticas en un Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH)

## ➤ Metodología

**Tipo de estudio:** estudio descriptivo transversal retrospectivo


**Población:** pacientes atendidos durante el año 2012 en el SUH de un hospital de tercer nivel

**Criterios de inclusión:** se extrajeron del sistema de registro las historias codificadas al alta del SUH como:


Hiperglucemia, cetoacidosis, descompensación diabética, hiperosmolaridad, coma hiperosmolar o hipoglucemia  
Y que fueran **Diabéticos tipo 2**

## Variables:


**Sociodemográficas:** edad, sexo




**Derivación:**



**Tratamiento que sigue para la diabetes**





**Destino:** ingreso/alta



**Estancia media**

## Desencadenantes



✓ La infección fue la causa de descompensación más frecuente en los >75años (p 0.006)

✓ La ITU, infección más frecuente en los procedentes de residencia de ancianos (p 0.000)

✓ El mal control de la diabetes aparecía en el 19.2% del total, aunque no es significativo, predomina en los pacientes de mayor edad (51,7%)