

¿DÓNDE ESTÁ LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL?

Autores: Santos Murillo Joaquín, Anglada Gutiérrez María Fernanda, Andreu Alcover Rosa Maria, González Sánchez Ignacio, Marcos Aldea Gemma, Vilà Moneeny Jordi

Objetivos:

- Conocer el registro de la disfunción eréctil (DE) de nuestra población y sus posibles causas

Metodología:

- Estudio descriptivo transversal
- Ámbito de estudio: Población masculina (11.153 personas) de un área urbana
- Criterios de inclusión: Pacientes hombres de 25-70 años, diagnosticados de disfunción eréctil hasta el 31/12/2012
- Variables analizadas: Edad, causas y fármacos asociados a disfunción eréctil

Comentario y conclusiones:

- Pese a que la prevalencia de DE en la población española entre los 25-70 años es del 12%, existe un infraregistro en nuestro ámbito de estudio, pues sólo el 0,83% presenta dicho diagnóstico
- El 90% , presenta una o más causas de DE
- El 65% toma uno o más fármacos causantes de DE, siendo los antidepresivos y ansiolíticos los más frecuentes
- El abordaje de esta patología a nivel de primaria sigue siendo escaso, por posible temor de la población masculina

Resultados:

- Existe un 0,83% de hombres diagnosticados de disfunción eréctil (80 pacientes)
- Edad media: 56,35+/-13,88 años
- 72 pacientes (90%) tienen una o mas causas de disfunción eréctil
- 52 pacientes (60%) toma uno o más fármacos que pueden causar disfunción eréctil

