

LIQUEN PLANO EROSIVO

VULVO-PERINEAL

Otegui Recio A.
OSI Goierri-Alto Urola. C Ezkio-Itsaso y Gabiria

- **Definición y descripción del caso**

- El liquen plano es una afección cutánea inflamatoria, relacionada con una alteración de la respuesta inmune.
- Clínica prurito, escozor o dolor con o sin erosiones.
- Tipos:
 - Hipertrófico
 - Escamoso
 - Erosivo
- Mujer 93 años hipertensa, fibrilación auricular y deterioro cognitivo, precisa absorbentes urinarios. Vida sedentaria cama-sillón, movilidad reducida y obesidad mórbida. Irritaciones periódicas por absorbentes y rascados.
- Inicia eritema e irritación progresiva a nivel de introito vulvar, labios mayores, periné y perianal con evolución a ulceración local.

- **D. diferencial y tratamiento.**

- Enfermedades ampollosas, Sde Behçet, vulvitis, erupción liquenoide, vaginitis descamativa, enfermedad de Crohn, neoplasia vulvar y reacciones liquenoides por tratamientos.
- El manejo debe incluir la información sobre la cronicidad del cuadro, instruir en higiene local y evitación de rascado .
- Tratamiento inicial con corticoides tópicos potentes (clobetasol 0.05%) asociados o no a tacrolimus 0.1% local. Si falta de respuesta utilizar corticoides sistémicos (triamcinolona).
- En este caso mediante “teledermatología” pudimos realizar una interconsulta con imagen a Dermatología sin tener que desplazar a la paciente de su domicilio .

POTENCIA DE LOS CORTICOIDES TOPICOS			
BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
.Hidrocortisona acetato 0.1-2.5%	.Betametasona valerato 0.1%	.Betametasona dipropionato 0.05%	.Clobetasol propionato 0.05%
	.Fluocinolona acetonido 0.01%	.Propionato de fluticasona 0.05%	
	.Prednicarbato 0.25%	.Mometasona furoato 0.1%	

