

MANEJO TERAPÉUTICO DE UNA COMPLICACIÓN TRAS MANIPULACIÓN ORAL

AUTORES: PINEDA PÉREZ, MARÍA SOLEDAD; RAMÍREZ PÉREZ, FRANCISCO ALEJANDRO;
MUÑOZ SANZ, MACARENA; MORENO MORENO, ANA.

INTRODUCCIÓN:

Mujer de 30 años de edad acude a urgencias por odontalgia de 3 días de evolución tras endodoncia previa de una pieza dentaria a nivel del primer cuadrante, que no mejora con el tratamiento antibiótico y analgésico.

DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL CASO:

Refiere odinofagia e importante componente inflamatorio que, según la paciente, ha ido en aumento hasta alcanzar el tercio inferior hemifacial derecho. A la en cavidad oral se aprecia celulitis en relación a la pieza 16 endodonciada, doloroso a la percusión.

Crepitación cervical.

TAC cervicofacial con contraste intravenosa donde se observa un extenso enfisema subcutáneo y espacios cervicales de predominio derecho.

Diagnosticándose de un enfisema subcutáneo por manipulación dental.





ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN:

Se comenta el caso con el servicio de Maxilofacial quienes refieren que es un enfisema por la turbina del dentista que se resolverá espontáneamente en unos 10-15 días y que continúe con el tratamiento antibiótico.

El enfisema subcutáneo es una complicación poco frecuente en la práctica odontológica, que ha ido en aumento debido al uso de instrumentos con aire a presión.

La mayor parte de los pacientes con esta complicación presentan resolución espontánea.



PALABRAS-CLAVE EMPLEADAS EN LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: Odontalgia, tratamiento restaurador, enfisema subcutáneo.

BIBLIOGRAFÍA: Gamboa Vidal CA, Vega Pizarro CA, Arriaga Almeida A. Enfisema subcutáneo durante tratamiento restaurador: caso clínico. Av Odontostomatol v.22 n.5 Madrid set.-oct. 2006.