



DEPRESIÓN Y DISFUNCIÓN SEXUAL


M. Herranz; E. Pablos; A. Fabra; J.M. Carmona; E. Romero; M. Caballero

Objetivo: estudiar la disfunción sexual asociada a tratamiento antidepresivo, comparar la diferencia entre consulta espontánea o planteada directamente al paciente sobre la disfunción sexual y la tolerancia a ésta según el sexo.

Metodología: estudio transversal, observacional realizado en Santa Perpetua de la Mogoda, población semiurbana de 22500 habitantes de la provincia de Barcelona. Período: del 2 enero al 30 de junio del 2013. **Participantes:** 100 pacientes de ambos sexos atendidos en el Centro de Salud con trastorno depresivo en tratamiento farmacológico sin queja previa a la instauración del mismo de disfunción sexual. Se realiza análisis bivalente mediante el programa estadístico EPI-INFO (test Chi-cuadrado).

Resultados:

N 100 pacientes
Varones 25%.
18,4% de los pacientes comunican de forma espontánea alguna alteración sexual.
48,6% del total presentaban disfunción sexual con pregunta dirigida.
Peor tolerancia a la disfunción sexual por los hombres.



Comentarios y conclusiones: observando el gran número de enfermos que ocultan el problema, parece razonable la realización de una encuesta sobre la función sexual previa al inicio de la toma de antidepresivos para analizar los posibles cambios posteriores, puesto que los pacientes que toman antidepresivo presentan una mayor disfunción sexual respecto a aquellos que no lo toman. El hombre tiene una peor tolerancia a la disfunción sexual, lo que implica mayor riesgo de abandono del tratamiento o empeoramiento de la depresión.